

ЧТО ТАКОЕ МАЛЯРИЯ?

ГБУЗ «Сорочинская РБ» информирует, что на территории Оренбургской области с 04.06.2014 года начался эпидсезон передачи малярии. Возможное появление первых случаев малярии с 18.06.2014 года.

Оренбургская область является потенциальным очагом – при наличии завозных случаев есть условия для ее передачи. Нерегулируемый поток жителей из стран ближнего и дальнего зарубежья осложняет ситуацию в области. Эта категория граждан остается длительное время не выявленными источниками инфекции.

МАЛЯРИЯ - инфекционное заболевание, которое передается от больного к здоровому человеку через укусы зараженных комаров.

Известны 4 формы малярии, наиболее опасной является тропическая малярия, которая при позднем обращении к врачу может привести к смертельному исходу.

Список стран, где встречается малярия:

- Азербайджан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан
- Страны Африки
- Азия
- Афганистан, Бангладеш, Бутан, Вьетнам, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Йемен, Камбоджа, Китай, Лаос, Малайзия, Мьянма (Бирма), Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Сирия, Таиланд, Турция, Филиппины, Шри-Ланка.
- Северная и Центральная Америка
- Гаити, Гватемала, Гондурас, Доминиканская республика Коста- Рика, Мексика, Никарагуа, Панама, Сальвадор
- Южная Америка Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Перу, Суринам, Эквадор
- Австралия и Океания Вануату, Папуа-Новая Гвинея, Соломоновы острова

Признаки болезни появляются не сразу, а по истечении скрытого периода, продолжительность которого может составлять от 10 дней до 14 месяцев. Болезнь протекает тяжело. Сопровождается общим недомоганием, сильным ознобом, приступами быстрого подъема температуры тела до 38-40 градусов. Через несколько часов температура резко снижается до 35-36 градусов с появлением обильной потливости и слабости. Число приступов достигает 10-15-ти. При отсутствии лечения, малярия может закончиться смертью больного.

Необходимо помнить, что ранние проявления малярии сходны с первыми признаками других заболеваний.

Заболевание малярией можно предупредить. С целью профилактики необходимо регулярно принимать противомаларийные препараты. Прием препаратов следует начинать за 1 неделю до выезда в тропики, продолжать весь период пребывания и в течение 1 месяца после возвращения.

Выбор препарата зависит от страны пребывания, доза определяется врачом. Во время пребывания в странах, неблагополучных по малярии, необходимо оберегать себя от укусов комаров. С этой целью в сумеречное и вечернее время рекомендуется применять репелленты (отпугивающие средства), которыми обрабатываются кожные покровы и одежда. Для предотвращения залета комаров в помещение окна и двери должны быть засетчены, в вечернее и ночное время можно использовать электрофумигаторы. Во время сна целесообразно пользоваться пологам.

Для обработки внутренних помещений используются электрофумигаторы, противомоскитные спирали, распылители (аэрозоли).

Народные средства, отпугивающие комаров: запахи гвоздики, эвкалипта, базилика, аниса — используются в виде масел для нанесения на кожные покровы или капнуть каплю масла на источник огня.

После возвращения из страны, неблагополучной по малярии, в течение 3-х лет, при любом повышении температуры немедленно обращайтесь в лечебное учреждение. Для облегчения диагностики нужно сказать врачу, что Вы побывали в неблагополучной по малярии местности.

Заболевание малярией можно предупредить.

ГБУЗ «Сорочинская РБ» информирует, что на территории Оренбургской области с 04.06.2014 года начался эпидсезон передачи малярии. Возможное появление первых случаев малярии с 18.06.2014 года.

Оренбургская область является потенциальным очагом – при наличии завозных случаев есть условия для ее передачи. Нерегулируемый поток жителей из стран ближнего и дальнего зарубежья осложняет ситуацию в области. Эта категория граждан остается длительное время не выявленными источниками инфекции.

Список стран, где встречается малярия:

- Азербайджан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан
- Страны Африки
- Азия
- Афганистан, Бангладеш, Бутан, Вьетнам, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Йемен, Камбоджа, Китай, Лаос, Малайзия, Мьянма (Бирма), Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Сирия, Таиланд, Турция, Филиппины, Шри-Ланка.
- Северная и Центральная Америка
- Гаити, Гватемала, Гондурас, Доминиканская республика Коста- Рика, Мексика, Никарагуа, Панама, Сальвадор
- Южная Америка Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Перу, Суринам, Эквадор
- Австралия и Океания Вануату, Папуа-Новая Гвинея, Соломоновы острова

МАЛЯРИЯ - инфекционное заболевание, которое передается от больного к здоровому человеку через укусы зараженных комаров.

Признаки болезни появляются не сразу, а по истечении скрытого периода, продолжительность которого может составлять от 10 дней до 14 месяцев. Болезнь протекает тяжело. Сопровождается общим недомоганием, сильным ознобом, приступами быстрого подъема температуры тела до 38-40 градусов. Через несколько часов температура резко снижается до 35-36 градусов с появлением обильной потливости и слабости. Число приступов достигает 10-15-ти. При отсутствии лечения, малярия может закончиться смертью больного.

После возвращения из страны, неблагополучной по малярии, в течение 3-х лет, при любом повышении температуры немедленно обращайтесь в лечебное учреждение. Для облегчения диагностики нужно сказать врачу, что Вы побывали в неблагополучной по малярии местности.